


COMUNE DI TORRIANA
PROVINCIA DI RIMINI

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE

progettista:

DOTT. ARCH. RENATO URBINATI
Via Isei, 2 - CESENA



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER:

ADOZIONE

N° DEL

IL SINDACO

CONTRODEDUZIONE

N° DEL

IL SEGRETARIO

APPROVAZIONE

N° DEL

IL TECNICO COMUNALE

OGGETTO:

NULLA-OSTA REGIONALE:

**ELENCO PIANTE ARBOREE E
ARBUSTIVE DA UTILIZZARE
PER IL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO**

NOTE:

SCALA

ELABORATO

6/C

"Allegato A"

**ELENCO PIANTE ARBOREE E ARBUSTIVE
DA UTILIZZARE PER IL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO**

INDICE

■ PIANTE ARBOREE

A. SPECIE AUTOCTONE O INDIGENE ITALIANE

- | | | |
|----------------------------------|------|----|
| a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI | pag. | iv |
| b. CADUCIFOGIE | pag. | iv |

B. SPECIE ESOTICHE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE

- | | | |
|----------------------------------|------|---|
| a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI | pag. | v |
| b. CADUCIFOGIE | pag. | v |

■ PIANTE ARBUSTIVE

A. SPECIE AUTOCTONEE O INDIGENE ITALIANE

- | | | |
|----------------------------------|------|------|
| a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI | pag. | viii |
| b. CADUCIFOGIE | pag. | x |

B. SPECIE ESOTICHE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE

- | | | |
|----------------------------------|------|-------|
| a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI | pag. | xvi |
| b. CADUCIFOGIE | pag. | xviii |

PIANTE ARBOREE

A. - SPECIE AUTOCTONE O INDIGENE ITALIANE

a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI

CUPRESSUS SEMPREVIERENS	(Cipresso comune)
OLEA EUROPAEA	(Olivo)
PINUS	(Pino SP.PL.)
QUERCUS ILEX	(Leccio)
QUERCUS	(Sugherella SP.PL.)

b. CADUCIFOGLIE

ACER	(Acerò SP.PL.)
CASTANEA SATIVA	(Castagno)
CARPINUS BETULUS	(Carpino SP.PL.)
CELTIS AUSTRALIS	(Bagolaro)
CERCIS SILIQUASTRUM	(Albero di Giuda)
FAGUS SYLVATICA	(Faggio)
FICUS CARICA	(Fico)
OSTRYA CARPINIFOLIA	(Carpino nero)
PLATANUS ORIENTALIS	(Platano orientale)
POPULUS	(Pioppo SP.PL.)
QUERCUS	(Quercia SP.PL.)
SALIX	(Salice SP.PL.)
TAMARIX	(Tamerice SP.PL.)
TILIA	(Tiglio SP.PL.)
ULMUS	(Olmo SP.PL.)

B. - SPECIE ESOTICHE EUROPEE ED EXTRA-EUROPEE

a. SEMPREVERDI E SEMISEMPREVERDI

ABIES	(Abeti SP.PL.)
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA	(Cipresso di Lawson)
CRYPTOMERIA JAPONICA	(Crittomeria)
CUPRESSUS MACROPARA	(Cipresso di Cahtornia)
LIEOCEDRUS DECURRENS	(Cedro bianco della California)
LIGUSTRUM	(SP.PL.)
MAGNOLIA	(Magnolia SP.PL.)
METASEQUOIA GLYPTOSTROBO DES	(Metasequoia)
PINUS	(Pini SP.PL.)
PRUNUS LAUROGERASUS	(Lauroceraso)
SEQUOIA SEMPREVIERENS	(Sequoia)
TAXODIUM DISTICHUM	(Cipresso calvo)
THUYA	(Tuia SP.PL.)

b. CADUCIFOGLIE

ACER	(Acerò SP.PL.)
ALBIZZA JULIBRISSIS	(Albizzia)
BROUSONETIA PAPYRIFERA	(Gelso da carta)
CARYA OVATA	(Noce Hickory)
CASTANEA CREMATA	(Castagno del Giappone)
CATALPA	(Catalpa SP.PL.)
CELTIS OCCIDENTALIS	(Olmo della Virginia)
CORYLUS COLURNA	(Nocciolo occidentale)
DIOSPYROS	(Loto o cachi SP.PL)
ELEAGNUS	(Eleagno SP.PL)
FAGUS ORIENTALIS	(Faggio Orientale)
FRAXINUS PENNSYLVANICA e F. AMERICANA	(Frassini Americani)
ÔLMÔ BILÔBA	(Ginkgo Biloba)
GLEDITSIA	(Spino di Cristo SP.PL.)
JUNGLAS	(Noce SP.PL)
LAGESTROEMIA INDICA	(Lagestroemia)
LIRIODENDRON TULIPIFERA	(Tulipifero virginiano)
LICUIDAMBAR STYRACIFULA	(Liquidambar)
MACLURA POMIFERA	(Maclura)

MAGNOLIA	(Magnolie caducifoglie SP.PL)
MELIA AZEDARACH	(Melia o Albero da Rosari)
PAULOWNIA TOMENTOSA	(Paulownia)
PLATANUS HYBRIDA	(Platano ibrido)
POPULUS	(Pioppo SP.PL)
PRUNUS	(Albicocco o ciliegi SP.PL)
PIEROCARYA FRAXINIFOLIA	(Pterocaria)
PUNICA GRANATUM	(Melograno)
PYRUS COMMUNIS	(Pero comune)
QUERCUS	(Quercia SP.PL.)
ROBINIA	(Robinia SP.PL)
RHUS TYPHINA	(Sommacco americano)
SALIX BABYLONICA	(Salice piangente)
SOPHORA JAPONICA	(Sofora)
TILIA	(Tiglio SP.PL.)
ULMUS	(Olmo SP.PL.)
ZELKOVA CRENATA	(Olmo del Caucaso)

PIANTE ARBUSTIVE

A. - SPECIE AUTOCTONE O INDIGENE ITALIANE

a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI

- AGAZZINO (Pyracantha coccinea)
(Cratengus pyracantha)
1-3 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto anche per siepi.
- AGRIFOGLIO (Ilex aquifolium)
1-5 m.; per terreni freschi ed esposizioni boreali riparate; adatto per gruppi di cespugli, siepi, sottobosco.
- ALTERNO (Rhannus alaternus)
1-4 m.; discretamente resistente alla salsedine.
- BOSSO (Buxus sempervierens)
1-3 m.; per terreni preferibilmente freschi, ma senza particolari esigenze; adatto siepi, sottobosco, gruppi di cespugli.
- BRUGO O CALLUNA (Calluna vulgaris)
0,5-1 m.; solo per terreni acidi (calcifuga) e pittusto freschi.
- BUPLERO ARBUSTIVO (Bupleurum fruticosum)
0,8-2 m.; per terreni asciutti o aridi, ambienti siccitosi, adatto per siepi e sottobosco.
- CORBEZZOLO (Arbustus unedo)
1,5-5 m.; per terreni asciutti o aridi in posizione calda e soleggiata o comunque riparata; adatto per cespugli, gruppi puri e misti, siepi.
- ERICA MAGGIORE (Erica arborea)
1-2 m.; solo per terreni acidi o neutri (calcifuga) in posizione ombreggiata; adatta per sottobosco.
- ERICA ROSA (Erica multiflora)
0,5-1,5 m.; solo per terreni acidi o neutri (calcifuga) in posizione ombreggiata; adatta per sottobosco; ma senza particolari esigenze di terreno.
- FILLIREA (Pyllirea latifolia, Ph. Media)
1-5 m.; per terreni asciutti o aridi in posizione calda e soleggiata o comunque riparata; adatto per cespugli, gruppi puri e misti,

siepi; discretamente resistenti alla salsedine, ma in posizione riparata dai venti boreali.

FILLIREA MINORE (Pillyrea augustifolia)
1,5-3,5 m; per terreni asciutti o aridi in posizione calda e soleggiata; discretamente resistente alla salsedine; adatta per cespugli, siepi.

GINEPRO COMUNE (Juniperus communis)
1-4 m.; per terreni freschi e posizioni ombreggiate.

LAUREOLA (Daphne laureola)
0,5-1.; per terreni freschi in posizione ombreggiata; adatta per sottobosco.

LAURO O ALLORO (Laurus nobilis)
2-6 m.; per qualsiasi tipo di terreno in posizioni calde e soleggiate, oppure ombrose, ma riparate molto; adatto per sottobosco e siepi.

LAUROTINO (Viburnum tinus)
1-5 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto per cespugli, siepi, sottobosco.

LAVANDA (Lavandula angustifolia =
L. spica)
0,5-0,8 m.; per terreni asciutti e aridi in posizioni riparate, adatta per piccoli cespugli e siepi basse.

LECCIO (Quercus ilex)
2-6 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto per cespugli isolati o in gruppi.

LENTISCO (Pistacia lentiscus)
1-3 m.; per terreni asciutti o aridi in posizione calda e soleggiata.

MIRTO (Myrtus communis)
0,5-2 m.; come il Laterisco.

OLEANDRO (Nerium oleander)
1,5-5 m.; senza particolari esigenze di terreno, in posizioni calde e riparate; adatto per cespugli, gruppi misti, siepi, alberetti.

ROSMARINO (Rosmarinus officinalis)
1-3 m.; per terreni asciutti in posizione calda e soleggiata o comunque riparata; adatto per cespugli e siepi.

SCOPA
O ERICA DA SCOPE (Erica scoparia)
0,5-1 m.; solo per terreni acidi (calcifuga) e piuttosto freschi.

TASSO (Taxus baccata)
2-6 m.; per terreni o esposizioni boreali; adatto per cespugli isolati e siepi.

b. CADUCIFOGLIE

ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)
2-5 m.; senza particolari esigenze ambientali; per cespugli, siepi, alberetti.

ACERO MINORE (Acer monspessulanum)
2-4 m.; senza particolari esigenze ambientali; per cespugli, siepi, alberetti; adatto anche per terreni molto asciutti e aridi.

AGNOCASTO (Vitex agnus castus)
1-4 m.; per terreni freschi o umidi; moderatamente resistente alla salsedine; adatto per cespugli, siepi alte, alberetti.

BIANCOSPINO (Crataegus monogyna e
C. laevigata =
C. oxya cantha)
2-6 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto per gruppi di cespugli misti, siepi, alberetti, sottobosco.

CAPRIFOGLI ARBUSTIVO (Lonicera xylosteum)
1-3 m.; per terreni freschi; adatto per cespugli, gruppi, siepi, sottobosco.

CARPINELLO (Carpinus orientalis)
2-5 m.; per posizioni calde e soleggiate; adatto per siepi e gruppi misti.

CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)
3-6 m.; per terreni freschi o esposizioni boreali riparate, adatto per siepi e gruppi misti.

CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)
3-6 m.; senza particolari esigenze ambientali, adatto per gruppi di cespugli e siepi.

CIAVARDELLO (Surbus torminalis)
2-6 m.; preferibilmente per terreni freschi in posizione riparata, ma anche per terreni asciutti in posizione di mezz'ombra; per cespugli, siepi, sottobosco.

CISTIO COMUNE (Cystisus sessilifolius)
1,5-3 m.; indifferente alle condizioni ambientali; per cespugli e siepi.

COLULTEA (Clolutea arborescens)
1-3 m.; come la Ginestra comune.

CORNILOLO (Cornus mas)
1-3 m.; per terreni freschi o umidi; adatto per grossi cespugli, siepi alte, alberetti; ma più esigente in ombra.

CRESPINO (Berberis vulgaris)
1-3 m.; senza particolari esigenze ambientali, ma preferibilmente in posizioni di mezz'ombra, per gruppi di cespugli misti e siepi.

DENDOLINO (Coronilla emerus)
1-3 m.; per terreni preferibilmente freschi in posizione di mezz'ombra; per cespugli e sottobosco.

FIOR D'ANGELO (Philadelphus coronarius)
2-3 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto per cespugli in gruppi puri o misti, siepi.

FRANGOLA (Frangula alnus)
(Rhamus frangula)
2-4 m.; per terreni freschi o umidi; adatta per grossi cespugli, siepi alte, alberetti.

FUSAGGINE (Euonymus europaeus)
1,5-3 m.; senza particolari esigenze ambientali, ma a preferenza per terreni moderatamente freschi e posizioni di mezz'ombra; adatto per cespugli, siepi, sottobosco.

- GINESTRA COMUNE (Spatium juncem)
1-3 m.; senza particolari esigenze ambientali, molto adatta per terreni aridi, per cespugli e siepi, ottima per consolidamento scarpate e argini.
- GINESTRONE (Ulex europaeus)
1-2 m.; per posizioni a mezz'ombra in freschi, neutri o subacidi (tendenzialmente calcifuga); per sottobosco.
- LIGUSTRO COMUNE (Ligustrum vulgare)
1-2 m.; come il sanguinello.
- MAGGIOCIONDOLO (Laburnum anagyroides)
(Cytisus laburnam)
2-6 m.; per terreni freschi o asciutti in posizione di mezz'ombra; per cespugli, siepi alberetti.
- MALEBBO (Prunus mehaleb)
2-5 m.; per terreni asciutti in posizione soleggiata; per gruppi di cespugli, siepi, alberetti.
- MELO ORNAMENTALE
2-4 m.; per terreni freschi o posizioni di mezz'ombra; adatto per gruppi di cespugli, siepi, sottobosco.
- MELO SELVATICO (Malus sylvestris)
2-4 m.; per terreni freschi o posizioni di mezz'ombra; adatto per gruppi di cespugli, siepi, sottobosco.
- MEZEREUM O FIOR-STECCO (Daphne mezereum)
0,5-1 m.; per terreni freschi e posizioni di mezz'ombra; adatta per piccoli cespugli in gruppi misti e sottobosco.
- NESPOLO (Mespilus germanica)
3-5 m.; per terreni freschi o asciutti in posizione di mezz'ombra; per cespugli, siepi, alberetti.
- NOCCIOLO (Corylus avellana)
2-5 m.; per terreni freschi e posizioni ombreggiate, adatto per gruppi di cespugli, siepi e sottobosco.
- ONTANO NERO (Alnus glutinosa)
3-6 m.; per terreni molto freschi o umidi.

OLIVELLO SPINOSO (Hippohae rhamnoides)
1-2 m.; per terreni freschi o moderatamente asciutti;
discretamente resistente alla salsedine; per cespugli, siepi
basse, consolidamento scarpate.

ORIELLO O FRASSINO MINORE (Fraxinus ornus)
2-6 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto per
cespugli, siepi alte, alberetti.

PADO (Prunus padu)
2-4 m.; per terreni freschi in posizione ombreggiata; per grossi
cespugli, siepi, alberetti.

PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)
1-4 m.; per terreni asciutti o aridi in posizione soleggiata; per
gruppi di cespugli misti e siepi.

PERO ORNAMENTALE
2-5 m.; per terreni freschi o posizioni di mezz'ombra; adatto per
gruppi di cespugli, siepi, sottobosco.

PERO SELVATICO (Pyrus pyraster)
(P. acharas)
2-5 m.; per terreni freschi o posizioni di mezz'ombra; adatto per
gruppi di cespugli, siepi, sottobosco.

PRUGNOLO SELVATICO (Prunus spinosa)
1-5 m.; per terreni freschi o asciutti in posizione di mezz'ombra;
per cespugli, siepi, alberetti.

ROSE DI MACCHIA (Rosa SP.PL.)
1-3 m.; per cespugli misti, siepi, sottobosco.

SALICE BIANCO O SALICONE (Salix alba e sue
sottospecie)
3-6 m.; molto adatto anche per consolidamento argini e
scarpate.

SALICE CAPRINO (Salix caprea)
2-5 m.; molto adatto anche per consolidamento argini e
scarpate.

SALICE DA CESTE (Salix trianda)
2-5 m.; molto adatto anche per consolidamento argini e
scarpate.

- SALICE FRAGILE (Salix fragilis)
2-6 m.; per terreni freschi o umidi.
- SALICE NERO (Salix nigricans)
1,5 - 4 m.; molto adatto anche per consolidamento argini e scarpate.
- SALICE ODOROSO (Salix pentandra)
2-5 m.; per terreni freschi o umidi.
- SALICE RIPAIOLO (Salix elaeagnos)
(S. Incana)
1,5-4 m.; molto adatto anche per consolidamento argini e scarpate.
- SALICE ROSSO (Salix purpurea)
1,5-4 m.; molto adatto anche per consolidamento argini e scarpate.
- SAMBUCO (Sambucus nigra)
2-4 m.; per ambienti freschi; adatto per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- SANGUINELLO (Cornus sanguinea)
1-3 m.; senza particolari esigenze, ma con preferenza generica per terreni freschi e posizioni di mezz'ombra; adatto per cespugli, siepi, sottobosco, consolidamento scarpate.
- SCOTANO
O SOMMACCO FRANCESE (Cotinus coggygria)
(Rhus cotinus)
1-3 m.; senza particolari esigenze ambientali; adatto per terreni aridi, cespugli, siepi, alberetti.
- SILICUASTRO
O ALBERO DI GIUDA (Cercis siliquastrum)
2-6 m.; indifferenti alle condizioni ambientali; per cespugli isolati o in gruppi puri e misti, siepi, alberetti.
- SORBO COMUNE (Sorbus domestica)
3-6 m.; per gruppi di cespugli puri o misti e siepi.
- SORBO DEGLI UCCELLATORI (Sorbus aucuparia)
2-5 m.; per terreni freschi in posizione ombreggiata; per grossi cespugli, siepi, alberetti.

SPINO CERVINO (Rhamus cathartica)
2-4 m.; per terreni piuttosto freschi e posizioni di mezz'ombra
cespugli siepi, alberetti, sottobosco.

STAFILEA (Staphilea pennata)
2-5 m.; per terreni freschi; adatta per grossi cespugli, siepi alte,
alberetti.

TAMERICI (Tamarix africana e
T. gallica)
2-6 m.; per terreni preferibilmente freschi, ma senza particolari
esigenze ambientali, resistenti alla salsedine; adatte per
cespugli, siepi, alberetti.

TEREBINTO (Pistacia terebinthus)
2-4 m.; per terreni asciutti o aridi in posizione soleggiata; adatto
per grossi cespugli, siepi alte, alberetti.

VIBURNO COMUNE (Viburnum opulus)
2-3 m.; per terreni freschi; adatto per cespugli, gruppi, siepi,
sottobosco.

B. - SPECIE ESOTICHE

a. SEMPREVERDI O SEMISEMPREVERDI

- AGAZZINO ITALIANO (Pyracanta crenulata)
1-3 m.; per cespugli e siepi.
- AGRIFOGLIO CORNUTO (Ilex cornuta)
2-4 m.; per cespugli e siepi.
- ARUNDINARIE (Arundinaria SP.PL.)
2-4 m.; per cespugli, siepi.
- BAMBU' (Phyllostachys SP.PL.)
(Bambusa SP.PL.)
2-6 m.; per cespugli, siepi.
- BOSSO DELLE BALEARI (Buxus belearica)
2-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- CEFALOTASSI (Cephalotexsus drupacea)
(C. fortunei)
(C. harringlotiana)
2-6 m.; per cespugli e siepi.
- COTOGNASTRO DEL NEPAL (Cotoneaster microphylla)
0,5-1 m.; per piccoli cespugli e siepi basse.
- COTOGNASTRO PROSTRATO (Cotoneaster horizontalis)
0.5-1 m.; per piccoli cespugli e siepi basse.
- CRESPINI SEMPREVERDI (Berberis aristata)
(B. darwini)
(B. wallichiana)
(B. wilsonae, ecc.)
0,8-3 m.; per cespugli e siepi.
- ELEAGNO DEL GIAPPONE (Eleagnus pungens =
E. reflexa)
1-4 m.; per cespugli, siepi, spalliere.
- EVONIMO DEL GIAPPONE (Eunoyumus japonica)
1-4 m.; per cespugli e siepi.
- FONTINIA CALIFORNIANA (Photinia arbutifolia)
1-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.

FONTINIA GIAPPONESE	(Photinia serrulata)
2-6 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
GINEPRO DEI BALCANI	(Juniperus excelsa)
2-6 m.; per cespugli e siepi.	
GINEPRO DELLA CINA	(Juniperus chinensis)
2-4 m.; per cespugli e siepi.	
GINEPRO DELL'ANATOLIA	(Juniperus drupacea)
2-4 m.; per cespugli e siepi.	
GINEPRO DELL'ARIZONA	(Juniperus pachuphloea)
2-4 m.; per cespugli e siepi.	
GINEPRO DELLA VIRGINIA	(Juniperus virginiana)
3-6 m.; per cespugli e siepi.	
GINEPRO DI SPAGNA	(Juniperus thurifera)
2-4 m.; per cespugli e siepi.	
LAUROCERASO	(Prunus laurocerasus)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LAUROCERASO PORTOGHESE	(Prunus lusitanica)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LAURO DELLA CAROLINA	(Prunus caroliniana)
2-6 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LIBOCEDRI	(Libocedrus chilensis)
	(L. decurrens)
	(L. codoniana)
2-5 m.; per cespugli e siepi.	
LIGUSTRO GIAPPONESE	(Ligustrum ibota)
2-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LIGUSTRO MAGGIORE	(Ligustrum lucidum = L. japonicum)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LIGUSTRO MINORE	(Ligustrum ovalifolium)
1-3 m.; per cespugli e siepi.	
MAGNOLIA	(Magnolia grandiflora e specie affini)

2-6 m.; per cespugli alti e alberetti.

MANOIA COMUNE (Mhanoia aquifolium)

0,8-1,5 m.; per cespugli, siepi e sottobosco.

MANOIA CINESE (Mhanoia fortunei)

0,8-1,5m.; per cespugli, siepi, sottobosco.

MANOIA DEL GIAPPONE (Mhanoia japonica)

1-2 m.; per cespugli, siepi, sottobosco.

MANOIA DEL NEPAL (Mhanoia nepalensis)

1-2 m.; per cespugli, siepi, sottobosco.

NESPOLO DEL GIAPPONE (Eriobotrya japonica)

2-4 m.; per cespugli e alberetti.

OLEA-AGRIFOGLIO (Osmanthus aquifolium)

1-2 m.; per cespugli e siepi.

OLEA FRAGRANTE (Osmanthus fragrans)

1-4 m.; per cespugli e siepi.

PITTOSPORO COMUNE (Pittosporum tobira)

1-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti, resistente alla salsedine.

TASSO AMERICANO (Taxus brevifolia)

2-5 m.; per cespugli e siepi.

TASSO GIAPPONESE (Taxus cuspidata)

2-5 m.; per cespugli e siepi.

TUIA AMERICANA (Thuja occidentalis)

2-4 m.; per cespugli e siepi.

TUIA ORIENTALE (Thuja orientalis)

2-4 m.; per cespugli e siepi.

VIBURNO ODOROSO (Viburnum odoratissimum)

1-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.

b. CADUCIFOGLIE

ABELIE (Abelia chinensis)

(A. triflora)

(A. uniflora)

1-2 m.; per cespugli.

- ALBICOCCO (Prunus ameniaca)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- AMORFA O FALSO INDACO (Amorpha fruticosa)
1-3 m.; per cespugli e siepi, ottima per consolidamento argini.
- ARANCINO SPINOSO (Poncirus trifoliatus =
citeus triptera)
1-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- AZZERUOLO AMERICANO (Crataegus crus-galli)
2-4 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- AZZERUOLO COMUNE (Crataegus azarolus)
3-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- AZZERUOLO GIALLO (Crataegus flava)
3-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- AZZERUOLO ROSSO (Crataegus carrierei)
2-4 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- BUDOLETE (Buddleja davidii)
(B. lindleyana ecc.)
2-4 m.; per cespugli e siepi.
- CALICANTO ESTIVO (Calycanthus floridus)
2-4 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- CALICANTO INVERNALE (Chimonanthus precox)
2-4 m.; per cespugli e siepi.
- CHELROITERIA (Koeleruteria paniculata)
3-5 m.; per cespugli e alberetti.
- CILIEGI DA FIORE (Prunus avium ecc.)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- CILIEGIO DELLA VIRGINIA (Prunus virginiana)
3-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- CLERODENDRO (Clerodendron foetidum)
1-3 m.; per cespugli e siepi.
- CLERODENDRO TARDIVO (Clerodendrom
trichotomum)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi alte, alberetti.

CORNILOLO AMERICANO	(<i>Comus florida</i>)
2-4 m.; per cespugli e siepi.	
CORNILOLO SIBERIANO	(<i>Comus alba</i>)
1-2 m.; per cespugli e siepi.	
COTOGNI GIAPPONESI	(<i>Chaenomeles japonica</i> e <i>Ch. speciosa</i>)
1-2 m.; per cespugli e siepi.	
COTOGNO COMUNE	(<i>Cydonia oblonga</i>)
2-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
CRESPINO GIAPPONESE	(<i>Berberis thunbergi</i>)
1-3 m.; per cespugli e siepi.	
DEUTZIE	(<i>Deutzia crenata</i> , <i>D. scabra</i> , <i>D. longifolia</i> , <i>D. lempinei</i>)
1-3 m.; per cespugli e siepi.	
ELEAGNO ARGENTEO	(<i>Eleagnus communata</i> = <i>E. argentea</i>)
2-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
ELEAGNO DEL GIAPPONE	(<i>Eleagnus umbellata</i> = <i>E. pavifolia</i>)
2-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
ELEAGNO O OLIVO DI BOEMIA	(<i>Eleagnus angustifolia</i>)
3-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
FISOCARPO	(<i>Poinciana gialliesii</i>)
2-4 m.; per cespugli e alberetti (solo per posizioni riparate e soleggiate).	
FORSIZIE	(<i>Forsythia viridissima</i> , e <i>F. suspensa</i> , ecc.)
1-3 m. per cespugli e siepi.	
GELSI	(<i>Morus alba</i> e <i>M. nigra</i>)
3-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	
GIUGGILOLO	(<i>Ziziphus jujuba</i> = <i>Z. sativa</i>)
3-6 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	

GOUMI	(<i>Eleagnus multiflora</i>)
1-3 m.; per cespugli e siepi.	
KERRIA	(<i>Kerria japonica</i>)
1-2 m.; per cespugli e siepi.	
IBISCO DELLA SIRIA	(<i>Hibiscus syriacus</i>)
1.5-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	
LAGHERSTREMIA	(<i>Lagerstroemia indica</i>)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	
LEGNO SANTO O LOTO	(<i>Diospyros lotus</i>)
3-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LICIO BARBARO	(<i>Lycium barbarum</i>)
1-3 m.; per cespugli e siepi.	
LICIO CINESE	(<i>Lycium chinense</i>)
1-3 m.; per cespugli e siepi.	
LILLA' O SIRINGA	(<i>Syringa vulgaris</i>)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
LILLA' SIBERIANO	(<i>Syringa amurensis</i>)
1,5-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
MACLURA	(<i>Maclura pomifera</i>)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	
MANDORLO	(<i>Prunus dulcis</i> = <i>P. amygdalus</i>)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
MARASCO O VISCIOLO	(<i>Prunus cerasus</i>)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.	
MELO COMUNE	(<i>Malus domestica</i>)
2-4 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	
MELO DA FIORE	(<i>Malus floribunda</i>)
3-6 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	
MELO DA FIORE	(<i>Malus baccata</i>)
2-6 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.	

- MELOGRANO (Punica granatum)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- MIRABOLANO (Prunus cerasifera e sue
varietà pissardii)
3-6 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- NOCCIOLO MAGGIORE (Corylus maxima)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- NOCCIOLO ORIENTALE (Corylus colurna)
3-6 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- PERO COMUNE (Pyrus comunis)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- PESCHI COMUNI E DA FIORE (Prunus persica)
1,5-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- PTELEA (Ptelea trifoliata)
2-5 m.; per cespugli, siepi, alberetti.
- ROBINIA (Robinia neomexicana)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- SILQUASTRO CANADESE (Cercis canadensis)
3-6 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- SINFORICARPO (Symphoricarpos albus
= S. racemosus)
1-2 m.; per cespugli e siepi.
- SOMMACCO (Rhus coriaria)
2-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- SOMMACCO AMERICANO (Rhus typhira = R. hirta)
1,5-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- SPINO DI CRISTO
O SPINO DI GIUDA (Gleditsia triacanthos)
3-5 m.; per grossi cespugli, siepi, alberetti.
- SPIREE ESOTICHE (Spirea SP. PL.)
0,5-2,5 m.; per cespugli e siepi.
- SUSINI COMUNI E DA FIORE (Prunus domestica ecc.)
1,5-4 m.; per cespugli, siepi, alberetti.